

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשע"ח 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא



טוניט טבליות 25 מ"ג

כל טבליה מכילה 25 מ"ג דוקסילאמין סוקסינט
Doxylamine Succinate 25 mg

לרשימת חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6
וסעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם
יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עלִי לטוֹל את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המיון
בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
אם למרות השימוש בתרופה, חוסר השנייה נמשך
יותר מעשרה ימים ברציפות, או להפסיק את השימוש
בתרופה ולפנות לרופא. חוסר שינה עלול להיות תסמין
למחלת רקע אחרת.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12. מתחת
לגיל זה יש לפנות לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת כעזר להקלה בהפרעת שינה זמנית.
קבוצה תרופית: אנטי היסטמינים.
מנגנון הפעולה של התרופה: חסימת פעולתם של
היסטמין וחומרים אחרים המצרים על-ידי הגוף כדי
לספק הקלה מתסמינים אלרגיים. התרופה גורמת בנוסף
להאטה בפעילות של מערכת העצבים המרכזית, אשר
מקלה על דודי שינה.
לא קיימת עדות לכך שהתרופה ממכרת.

2. לפני השימוש בתרופה:

⚠ אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דוקסילאמין
סוקסינט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים
אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). תסמינים
של תגובה אלרגית עשויים לכלול: שיעול, קוצר
נשימה, חרחור או קושי לנשום; התנפחות הפנים,
השפתיים, הלשון, הגרון או חלקים אחרים בגוף;
פריחה, גירוד או סרפדת בעור, התעלפות או
תסמינים דמויי קדחת השחית. במידה ואתה חושב
שאתה חווה תגובה אלרגית, הפסק את נטילת
התרופה ופנה מיד לרופא או לחדר המיון בבית
החולים הקרוב.

- הנך סובל או סבלת מבעיות נשימה כגון: אסטמה
או דלקת סימפונות (ברונכיטיס) כרונית.
- הנך סובל או סבלת ממחלת כבד או כליות חמורה.
- הנך סובל או סבלת מבירקית (גלאוקומה)
סגורת-זיית.
- הנך סובל או סבלת מבעיות בבלוטת הערמונית
(פרוסטטה).
- הנך מתקשה או התקשית במתן שתן.
- הנך סובל או סבלת מהיצרות או חסימה בין
הקיבה למעי הדק הגורמת להקאה של מזון לא
מעוכל.
- הנך סובל או סבלת מאפילפסיה.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני הטיפול בטוניט, ספר לרופא אם:**
 - הנך בהריון, מניקה או מתכננת להרות (ראי סעיף
"הריון, הנקה ופוריות").
- ⚠ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:**
**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר
על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או
הרוקח אם אתה לוקח:
 - תרופות נגד דיכאון ממשפחת מעכבי מונואמין
אוקסידאז (MAO inhibitors), כגון: מוקלובמיד,
פנלזין, טרנזיצפרומין.
 - תרופות נגד דיכאון ממשפחת הטריציקליים, כגון:
אמיטריפילין, אימפרמין, נוטרופילין, דוקספין.
 - משככי כאבים חזקים, כגון: קודאין, מורפין.
 - תרופות אחרות המסייעות לשינה, כגון: טמפאם,
טריאזולאם או ניטראפאם.
 - תרופות לטיפול בחרדה, כגון: אוקספאם, דיאפאם.
 - אנטיביוטיקה מסוג אמינגליקוזידים, כגון:
טובראמציין.

⚠ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

נהג זהירות בשתיית אלכוהול (יינות ומשקאות חריפים)
בתקופת הטיפול בתרופה. השפעות האלכוהול עלולות
להיות חמורות יותר בשילוב עם תרופות אנטיהיסטמיניות
כמו טוניט.

⚠ הריון, הנקה ופוריות:

יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם הנך בהריון או מתכננת
להרות.
לא קיימת עדות לכך שהתרופה גורמת למומים מולדים,
אך לא נערכו מחקרים המוכיחים את בטיחות השימוש
בתרופה להתפתחות העובר.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם הנך מניקה או מתכננת
להניק.
כמויות קטנות של התרופה עוברות בחלב האם. קיימת
אפשרות שהתינוק הנזון מחלב אם יהפוך להיות רגיש
או מעורר באופן בלתי רגיל. כמו כן, התרופה עלולה
להשפיע על ייצור החלב.

⚠ נהיגה ושימוש במכוניות:

בזמן השימוש בתרופה, יש לנקוט זהירות בעת נהיגה
ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת
עירנות, בגלל שהשימוש בטוניט עלול לפגוע בערנות
ביום שלמחרת נטילת התרופה.

⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ועל כן
נחשבת נטולת-נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע
למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים וילידים מגיל 12
ומעלה: חצי טבליה עד טבליה, כחצי שעה לפני השינה.
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילידים מתחת לגיל
12 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

אין להשתמש בתרופה זו מעבר לעשרה ימים רצופים.
במידה והפרעת השינה נמשכת מעל לעשרה ימים, יש
לפנות לרופא.

צורת הנטילה

יש לבלוע את התרופה עם מים. ניתן ליטול את התרופה
עם אוכל.

יש ליטול תרופה זו רק לפני השינה.

כתישה/חצייה/לעיסה
אין ללעוס, הטבליה מיועדת לבליעה.
ניתן לחצות את הטבליה. במקרה הצורך ניתן לכתוש
את הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אתה עלול להרגיש:

- ישנוניות חמורה
- יובש חמור בפה, באף ובגרון
- אדמומיות בפנים
- דפיקות לב מהירות, הולמות או לא סדירות
- קוצר נשימה
- הזיות
- פרוסים, עוויתות
- דודי שינה
- אישונים מורחבים

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את
אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך
זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,
היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בטוניט עלול לגרום לתופעות
לואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת

תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
אם אתה מעל גיל 65 שנים, ייתכן שהסיכוי להופעת
תופעות לוואי יהיה גדול יותר.

תופעות הלוואי הבאות הן היותר שכיחות, בד"כ הן

מתונות ועוברות לאחר זמן קצר:

- ישנוניות במהלך היום שלאחר השימוש בתרופה
- סחרחורת
- חוסר קואורדינציה
- יובש בפה, באף ו/או בגרון
- כאב ראש
- חולשת שרירים
- חלזת צמיגה

תופעות לוואי חמורות הינן נדירות.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה סובל מ:

- דפיקות לב מהירות, הולמות או לא סדירות
- חלחץ דם נמוך
- קושי במתן שתן
- עצירות
- צממורות
- עצבנות
- חוסר שקט
- עוררות
- התעלפות
- טשטוש ראייה
- ריפולקס (החזר קיבתי) מוגבר

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי
מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא
הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות
לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול
תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על
תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור
במקום סגור מחוץ לשידה ראייתם והישג ידם של
ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אל
תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP)
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס
ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Microcrystalline Cellulose, Dibasic Calcium
Phosphate Dihydrate, Sodium Starch Glycolate,
Magnesium Stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: טבליה
אובלית בצבע לבן-שומנת, עם קו חצייה בצד אחד.
התרופה מגיעה באריזת בליסטר המכילה 2, 5 או 10
טבליות. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן/בעל הרישום וכתובתו:

בע"מ, רחוב הקדמה 3, ת.ד. 385, קריית מלאכי, ישראל.
עלון זה נערך בתאריך 12/2021 בהתאם להוראות
משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי
במשרד הבריאות: 00-29793-20-118.
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון
זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



LFL 001 12/21